

**HYANEB®** - Solución para inhalación para movilizar las secreciones mucosas

HYANEB® - Solución hipertónica estéril para inhalación. Cloruro de sodio 7%, hialuronato de sodio 0,1%.

Presentación: 30 viales estériles con 5 ml.

### Composición

Hyaneb® solución hipertónica para inhalación.

1 ml de agua destilada contiene: cloruro de sodio 70 mg, hialuronato de sodio 1 mg.



### Indicaciones

La inhalación de Hyaneb® facilita la movilización de la secreción viscosa de las vías aéreas gracias a un mecanismo físico (osmótico). El alto porcentaje de sal atrae agua y facilita la hidratación del moco. Hyaneb® está particularmente indicado en pacientes con fibrosis quística y en personas con bronquiectasias.

### Contraindicaciones

Hyaneb® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus componentes.

### Instrucciones de uso

Puede utilizarse con cualquier nebulizador jet. Para un resultado óptimo se recomienda usar un nebulizador jet de *Pari*. También puede utilizarse con nebulizadores de malla vibrante. En caso de utilizar un *eFlow rapid*, para mejorar la nebulización se recomienda humedecer la membrana sumergiéndola en agua destilada hervida antes de cada uso. Si el nebulizador acaba de utilizarse, no es necesario humedecer la membrana. La boquilla del nebulizador se coloca en la boca y el paciente debe respirar regularmente. La duración de la sesión de aerosolterapia está en torno a 10 minutos. Temperatura de utilización: nebulizar la solución a temperatura ambiente.

### Precauciones de empleo

- El producto es solo para uso inhalatorio.
- La primera vez que se use el producto debe realizarse bajo control médico o de personal cualificado. El uso por parte de niños debe hacerse bajo la supervisión de un adulto.
- En sujetos particularmente sensibles es aconsejable la administración previa de un broncodilatador para prevenir broncoespasmo, especialmente al inicio del tratamiento. La medicación previa con un broncodilatador debe hacerse bajo control médico.
- En caso de broncoespasmo o tos persistente interrumpir el tratamiento y comunicar al médico que le trata.
- No utilizar el producto en caso de que el envase estuviera dañado o no perfectamente cerrado en el momento de la primera apertura.
- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### Posología

Utilizar un vial de 5 ml dos veces al día o según prescripción médica. Es posible empezar con un volumen inferior e ir aumentándolo progresivamente. No reutilizar el contenido residual del vial. No mezclar la solución hipertónica con otros medicamentos.

### Condiciones de conservación

Conservar a temperatura ambiente y mantener alejado del alcance de los niños.

### Fabricante

Eupharma s.r.l.

Stradello Marche, 6 - 43121 Parma - Italia

Fecha de la última revisión: Diciembre 2012