

## **PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO**

**Ibukey 50 mg/g gel**

ibuprofeno

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 7 días de tratamiento, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es Ibukey y para qué se utiliza
2. Antes de usar Ibukey
3. Cómo usar Ibukey
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Ibukey
6. Información adicional

### **1. QUÉ ES IBUKEY Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Ibukey es un gel para uso cutáneo (sobre piel).

Este medicamento actúa como analgésico y antiinflamatorio local.

Ibukey está indicado para aliviar localmente el dolor e inflamación leves y ocasionales producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura.

### **2. ANTES DE USAR IBUKEY**

**No use Ibukey si:**

- Es usted alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes del medicamento.
- Tiene una quemadura solar en la zona afectada.
- Ha sufrido reacciones alérgicas (rinitis, dificultad para respirar o asma, urticaria, prurito u otras) causadas por ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroídicos.

### **Tenga especial cuidado con Ibukey ya que:**

- No debe utilizarse sobre mucosas, ni sobre piel con heridas o eczemas.
- Si es asmático o alérgico a algún colorante utilizado en alimentación o medicamentos (como por ejemplo: amarillo-anaranjado tartrazina, etc...)
- Debe evitar el contacto con los ojos.
- No debe exponer al sol la zona tratada, ni utilizar con vendajes ni en zonas extensas.
- No debe aplicar simultáneamente Ibukey en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos.

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### **Uso en niños**

No utilizar este medicamento en niños menores de 12 años.

### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta médica homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se ha descrito ningún efecto.

## **3. CÓMO USAR IBUKEY**

Siga estas instrucciones, a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Éste es un medicamento de uso cutáneo exclusivamente externo (sobre la piel).

Mayores de 12 años: aplique una fina capa del producto en la zona dolorida de 3 a 4 veces al día y realice un ligero masaje para facilitar la penetración.

Lávese las manos después de cada aplicación.

No utilizar más de 7 días seguidos.

Si estima que la acción de Ibukey es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

|

### **Si usa más Ibukey del que debiera:**

Debido a su uso externo, no es probable que se produzcan casos de intoxicación. En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente a un centro médico o bien llame al Servicio de Información Toxicológica (Tel: 915.620.420), indicando el medicamento y la cantidad ingerida, ya que se puede producir: náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, vértigo, espasmos y bajada de la tensión arterial.

### **Si olvidó usar Ibukey**

En caso de olvido de una dosis, espere a la siguiente. Pero no use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, Ibukey puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran

- Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes): enrojecimiento, picor y sensación de quemazón cutánea en la zona de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.

- Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 pacientes): dermatitis (inflamación de la piel) producida por el sol.


Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

## **5. CONSERVACIÓN DE IBUKEY**

### **Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños**

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase tras la abreviatura: CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases de los medicamentos que no necesita en el punto Sigre  de su farmacia habitual. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De ésta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

### **Composición de Ibukey**

- El principio activo es Ibuprofeno. Cada gramo de gel contiene 50 mg de ibuprofeno.

- Los demás componentes (excipientes) son hidróxido de sodio, alcohol isopropílico, hidroxietilcelulosa alcohol bencílico, perfume herboral 72353 y agua purificada.

**Aspecto del producto y contenido del envase:**

Es un gel homogéneo incoloro y transparente, envasado en tubos de polietileno de baja densidad, multicapa de color blanco y tapón de polietileno de alta densidad de color blanco

Se presenta en tubos con 30 g y 60 g de gel. Es posible que no todas las presentaciones estén comercializadas.

**TITULAR:**

PHARMINICIO, S.L.  
Paseo de la Habana 9-11  
28036 MADRID

**RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:**

Laboratorios ALCALA FARMA, S.L.  
Carretera M-300, Km 29,920  
28802 Alcalá de Henares (MADRID)

**Este prospecto ha sido aprobado: Mayo 2011.**

**La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**  
<http://www.aemps.gob.es/>