



PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

ECHINACIN MADAUS solución oral

Echinacea purpurea

L e a t o d o e l
p r o s p e c t o
d e t e n i d a m e n t e
p o r q u e c o n t i e n e
i n f o r m a c i ó n
i m p o r t a n t e p a r a
u s t e d

Contenido del prospecto:

1. Qué es ECHINACIN MADAUS y para qué se utiliza
2. Antes de tomar ECHINACIN MADAUS
3. Cómo tomar ECHINACIN MADAUS
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ECHINACIN MADAUS
6. Información adicional

1. QUÉ ES ECHINACIN MADAUS Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es una solución oral del jugo fresco de las partes aéreas floridas de la planta *Echinacea purpurea*. Se presenta en un envase conteniendo 50 ml de solución para administración por vía oral y lleva incorporado un vaso dosificador.

ECHINACIN MADAUS solución oral actúa favoreciendo las defensas inespecíficas del organismo.

ECHINACIN MADAUS solución oral se utiliza para el tratamiento complementario del resfriado común e irritación de las vías respiratorias altas.

2. ANTES DE TOMAR ECHINACIN MADAUS

No tome ECHINACIN MADAUS

- Si es alérgico (hipersensible) al jugo de *Echinacea purpurea* o a cualquiera de los demás componentes de Echinacin Madaus.
- Si ha presentado reacciones alérgicas conocidas a las flores de la familia de las Astéridas o Compuestas, a la que pertenece la *Echinacea purpurea*.
- Si padece tuberculosis
- Si padece leucemia
- Si presenta enfermedades sistémicas progresivas como colagenosis y esclerosis múltiple.
- Si padece el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades del sistema inmunitario.
- Si tiene menos de 12 años

Tenga especial cuidado con ECHINACIN MADAUS

Si usted necesita iniciar un nuevo tratamiento, debe dejar unos días de descanso entre ambos. No debe administrarse durante un periodo de tiempo superior a 8 semanas.

Si los síntomas empeoran o si persisten después de 7 días, debe consultar al médico.

En caso de fiebre, dificultad respiratoria y dolor persistente o de origen desconocido, consulte a su médico.

Uso de otros medicamentos

No se conocen interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Toma de ECHINACIN MADAUS con los alimentos y bebidas:

ECHINACIN MADAUS se puede tomar en horas diferentes a las comidas.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Como precaución especial y debido a que no se dispone de datos sobre su utilización durante el embarazo ni lactancia, no se recomienda su uso en dichas situaciones.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de ECHINACIN MADAUS

Este medicamento contiene 22% v/v de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 452,5 mg por dosis (2,5 ml), lo que equivale a 10 ml de cerveza ó 5 ml de vino.

Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo.

El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

3. CÓMO TOMAR ECHINACIN MADAUS

Siga exactamente las instrucciones de administración de ECHINACIN MADAUS indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Recuerde tomar su medicamento.

La dosis normal es:

Adultos, ancianos y niños mayores de 12 años:

El tratamiento durante el primer día es de una toma inicial de 2,5 ml, seguida de tomas de 1,5 ml en intervalos de 1 ó 2 horas, hasta un máximo de 15 ml. Los siguientes días se administrarán 2,5 ml 3 veces al día.

No administrar a niños menores de 12 años.

La duración recomendada del tratamiento es de 7 a 15 días.

Diluir el preparado en un poco de agua antes de tomarlo.

Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted toma más ECHINACIN MADAUS del que debiera:

Debido a su contenido en etanol, en caso de ingestión masiva, pueden presentarse síntomas de intoxicación etílica.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar ECHINACIN MADAUS

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, ECHINACIN MADAUS puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran.

En muy raras ocasiones pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad con sus síntomas típicos como erupción cutánea y/o picor, raramente se ha observado hinchazón de la cara (edema facial), dificultad respiratoria, vértigo e hipotensión.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE ECHINACIN MADAUS

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar el envase en el embalaje exterior.

Mantener el envase perfectamente cerrado.

Caducidad

No utilice ECHINACIN MADAUS después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6.-INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de ECHINACIN MADAUS

- El principio activo es jugo fresco de las partes floridas de *Echinacea purpurea* 800 mg.
- Los demás componentes son: etanol 22% v/v y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Este medicamento es una solución de color marrón claro. Se presenta en un envase conteniendo 50 ml de solución para administración por vía oral y lleva incorporado un vaso dosificador.





Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular

ROTTAPHARM, S.L.

Avda. Diagonal, 67-69

08019 Barcelona (España)

Responsable de la fabricación

MADAUS GmbH

51101 Colonia (Alemania)

Este prospecto ha sido aprobado en: marzo 2011