



## Resorborina®

Solución bucofaríngea

Antiinfeccioso buco-faríngeo

### PROPIEDADES

Las afecciones inflamatorias de la región buco-faríngea requieren las siguientes acciones terapéuticas: antiséptica, analgésica, antiflogística y astringente. El desarrollo de estas acciones, a través de sus componentes, caracteriza a RESORBORINA solución como el preparado adecuado para ser utilizado en la curación de la mayor parte de los procesos inflamatorios e infecciosos tan frecuentes en esta zona anatómica.

### COMPOSICIÓN

|  | Por 100 |
|--|---------|
| ml   |         |
| Benzalconio cloruro (D.O.E.).....  | 100     |
| mg   |         |
| Tetracaína (D.O.E.) clorhidrato.....   | 20      |
| mg   |         |
| Dexametasona (D.O.E.) .....  | 5       |
| mg   |         |
| Resorcinol (D.O.E.).....   | 2 g     |
| Excipientes: Alcohol 96° (22,5 % v/v), glicerol, jarabe simple,<br>esencia soluble de menta piperita y agua purificada |         |
|  | .c.s.   |

### TITULAR

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

### FABRICANTE

LABORATORIOS ERN, S.A. Polígono Industrial Can Salvatella. Calle Gorcs i Lladó, 188 08210 Barberá del Vallés, España

O

LABORATORIOS ERN, S.A. Peru, 228. 08020 Barcelona, España

### INDICACIONES

Faringitis. Estomatitis. Llagas de boca y lengua. Gingivitis. Piorrea. Anginas de distinta etiología. Infecciones crónicas de garganta. Infecciones crónicas del tejido linfóide faríngeo.

### POSOLOGIA

Gargarismos: Diluir una cucharadita del preparado en dos cucharadas de agua.

Pulverizaciones: Aplicar sola o diluida con agua templada, mediante un pulverizador apropiado.

En ambos casos, administrar de 3 a 6 veces diarias, según prescripción médica.

### ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

"ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES": Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a componentes.



### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Raramente reacciones alérgicas.

El paciente debe comunicar a su médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

### **PRESENTACIÓN**

Frasco con 100 y 200 ml de solución.

**Antes de su administración, compruebe que la fecha de caducidad de los envases no ha sido sobrepasada.**

**Sin receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

“Logotipo”

Laboratorios ERN, S.A.

Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.