

# FOLIFERRON®

En determinadas circunstancias, el organismo tiene incrementadas sus necesidades de hierro, componente esencial de la hemoglobina para el transporte de oxígeno a los tejidos y para la actividad de los enzimas respiratorios. Estas situaciones se presentan durante el embarazo y la lactancia, estados fisiológicos de mayor consumo de hierro, en los que los depósitos del mismo pueden resultar insuficientes. Por ello, es conveniente suplementar con hierro la dieta de la mujer gestante o lactante, para prevenir la anemia y las alteraciones que derivan de la misma (fatiga, palpitaciones, caída de pelo o fragilidad ungueal).

También se ha demostrado que, durante el embarazo, es conveniente administrar de forma profiláctica ácido fólico, factor vitamínico que interviene en la síntesis de importantes elementos biológicos y cuya deficiencia puede provocar malformaciones fetales.

FOLIFERRON asocia, en proporciones adecuadas, hierro en forma fácilmente absorbible y ácido fólico, constituyendo una aportación razonable de estos factores durante la gestación o lactancia.

## Composición

Fumarato ferroso, 100 mg (equivalentes a 32,8 mg de hierro); ácido fólico (D.C.I.), 0,150 mg.

Excipientes: sacarosa, 165 mg; almidón de maíz; estearato magnésico; celulosa microcristalina; kollidon; alcohol cetílico; sílice coloidal; polietilenglicol 3350; primojel sódico; goma arábiga; polietilenglicol 6000; fosfato tricálcico; gelatina; polivinilpirrolidona; eudragit E; talco; pigmento óxido de hierro pardo rojizo; pigmento óxido de hierro amarillo (E-172); cera E. c.s.p. 1 gragea.

## Indicaciones

Prevención de deficiencias en hierro y ácido fólico en embarazadas.


Prevención de alteraciones en la formación del tubo neural en el feto.

## Dosis y modo de empleo

1 gragea, 3 veces al día, después de las comidas, tragadas sin masticar con algo de líquido.

## Contraindicaciones

Exceso de hierro en el organismo, hemocromatosis o siderosis.



## **Precauciones**

Deberá emplearse con precaución en presencia de afecciones del tracto digestivo, tales como ulcera gastroduodenal, afecciones gástricas crónicas y colitis ulcerosa.

## **Incompatibilidades e Interacciones**

La administración oral de hierro es compatible con la de otras medicaciones, a excepción de agentes quelantes (EDTA sódico, etc.).

## **Advertencia**

Este medicamento contiene 165 mg de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por las pacientes diabéticas.

La ingestión de preparados de hierro ocasiona la aparición de heces oscuras, hecho que carece de importancia.

Este medicamento no está indicado para el tratamiento de la anemia megaloblástica establecida, de las embarazadas.

## **Efectos secundarios**

La administración oral de FOLIFERRON difícilmente puede producir trastornos generales, ya que la absorción de sales orgánicas por el organismo, es limitada.

## **Intoxicación y su tratamiento**

La intoxicación por hierro sólo puede producirse por administración de dosis muy elevadas, repetidas y continuadas. Se tratará con desferrioxamina y supresión de la medicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

## **Presentación**

Envase con 30 grageas.

**SIN RECETA MÉDICA**

**" LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL  
ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS "**



**TEOFARMA srl**  
Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) - Italia  
Tel. 0039/0382/422008 - Fax 0039/0382/525845  
e-mail: [servizioclienti@teofarma.it](mailto:servizioclienti@teofarma.it)

Cod. 01FOFOLI01