

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado CHICLIDA CHICLE para obtener los mejores resultados.
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días, debe consultar a su médico.

Lactancia:
Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Uso de otros medicamentos:
Chiclida Chicle puede intensificar la efectividad de otros medicamentos administrados al mismo tiempo como son los somníferos, estimulantes y/o anticolinérgicos. Se deberá vigilar el uso de antibióticos con ototoxicidad, tranquilizantes del S.N.C. y bebidas alcohólicas.
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria:
Este medicamento puede provocar somnolencia en algunas personas. Uselo con precaución si va a conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento, ya que pueden aumentar la somnolencia.


3. COMO USAR CHICLIDA CHICLE
Las dosis recomendadas son diferentes en niños y adultos:
- Dosis en adultos y niños mayores de 12 años: De 1 ó 2 chicles al menos media hora antes de iniciar el viaje. No tome más de 100 mg al día. No deben tragarse.
- Dosis en niños de 8 a 12 años: De 1 chicle al menos media hora antes de iniciar el viaje. No tome más de 50 mg al día. No debe tragarse.
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Recuerde tomar su medicamento.

Si usted usa más Chiclida Chicle del que debiera:
No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación, debido a su margen terapéutico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Como todos los medicamentos, Chiclida Chicle puede tener efectos adversos.
Los efectos adversos de la meclozina son, en general, leves y de corta duración. Entre ellos destacan los siguientes: somnolencia, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, dilatación de las pupilas, urticaria. Pueden aparecer otros efectos adversos. Si observa estas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE CHICLIDA CHICLE
Mantenga Chiclida Chicle fuera del alcance y de la vista de los niños. No se precisan condiciones especiales de conservación.
Caducidad:
No utilice Chiclida Chicle después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido revisado en Junio/2006.

 **Dr. Torrents** Titular: Dr. Torrents, S.A.
Laboratorio Farmacéutico Av. Hospital s/n.
08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona)

En este prospecto:

1. Qué es Chiclida Chicle y para qué se utiliza
2. Antes de usar Chiclida Chicle
3. Cómo usar Chiclida Chicle
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Chiclida Chicle

**CHICLIDA CHICLE
Meclozina**

Cada chicle contiene 25 mg de meclozina como principio activo. Los demás componentes son: goma base, azúcares, lecitina de soja y esencia.

1. QUÉ ES CHICLIDA CHICLE Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Se presenta en forma de chicles, en envases de 6 y 12 chicles. La meclozina pertenece al grupo de los antihistamínicos. Este medicamento está indicado para prevenir y tratar el mareo, las náuseas y los vómitos provocados por cualquier medio de locomoción.

2. ANTES DE USAR CHICLIDA CHICLE

No use Chiclida Chicle cuando:
- Si Ud. tiene hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.
- No debe ser suministrado a pacientes diabéticos.
- En niños menores de 6 años.

Tenga especial cuidado con Chiclida Chicle si:

- Se recomienda especial precaución si padece una de las siguientes enfermedades: enfermedad pulmonar crónica (como asma, bronquitis o enfisema), enfermedad del corazón, enfermedad prostática, hipertensión ocular, obstrucción intestinal u obstrucción urinaria.
- Debe usarse con especial control médico en los casos de enfermedad hepática y de epilepsia.
- El uso de meclozina puede provocar sequedad de boca, nariz y garganta.
- El uso de medicamentos para tratar la alergia, la depresión y el insomnio, junto con la meclozina, pueden aumentar los efectos de somnolencia. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando uno de estos medicamentos.
- El uso de meclozina puede enmascarar la posible ototoxicidad producida por otros fármacos.
- Se recomienda especial precaución cuando se administra la meclozina a niños o ancianos, por ser más frecuente la aparición de efectos adversos.

Uso en ancianos

Informe a su médico si sufre alguna enfermedad. Puede que su médico tenga que ajustarle la dosis o espaciarle las tomas del medicamento.

Embarazo:

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.