838151.7-E.F.P.

iodina

125 ml

POVIDONA IODADA 10%

COMPOSICIÓN POR 100 ml.:
Povidona (D.C.I.) iodada ..... 10 g.
EXCIPIENTES: Lauril sulfato sódico 0,06 g. agua purificada c.s.p. 100 ml. Fosfato disódico dodecahidratado c.s.p. pH 5-5,5.
INDICACIONES: Desinfección de la piel y heridas superficiales.
POSOLOGÍA: Aplicar directamente sobre la piel o la zona a tratar.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al iodo o medicamentos iodados.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos.
INCOMPATIBILIDADES: No debe emplearse junto a preparados mercuriales.
EFECTOS SECUNDARIOS: En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergias, debe suspenderse el tratamiento.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: En casos de ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o llamar al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.
CONTENIDO:..... 125 ml.
NO INGERIR. USO EXTERNO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricante:
LAB. REIG JOFRÉ, S.A.
Avda. Gran Capita, 10
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)

Titular:
LAB. FARM. ORRAVAN, S.L.
Avda. Gran Capita, 10
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)

C.N. 838151.7-E.F.P.
B04145-07
SIN RECETA MÉDICA